

Información sobre la vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas. SIREVA II. OPS. 2014
Neisseria meningitidis

Información sobre los aislamientos invasores

Año:

2014

País

ARGENTINA

Institución

INEI-ANLIS C. G. Malbrán

Responsable

Mabel Regueira- Alejandra Corso- Adriana Efron- Paula Gagetti

Tablas

[Tabla 1. Número de aislamientos de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y sexo](#)

[Tabla 2. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por enfermedad y por grupos de edad.](#)

[Tabla 3. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y fuente](#)

[Tablas 4. Distribución de los serogrupos capsulares de los aislamientos invasores *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y enfermedad](#)

[Tabla 5. Sensibilidad antimicrobiana de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad](#)

Instrucciones:

1. Haga clic en la tabla que va a diligenciar.
2. Cuando termine de diligenciar la tabla, vaya al final de ella y haga clic en "volver a la página general", para seleccionar la siguiente tabla.
3. Por favor, diligencie todos los cuadros,

Tabla 1. Número de aislamientos de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y sexo. 2014

Grupos de edad	Sexo						Total	
	Masculino		Femenino		Sin dato			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	32	47,1	36	52,9	0	0,0	68	45,6
12-23 meses	5	41,7	7	58,3	0	0,0	12	8,1
24-59 meses	12	63,2	7	36,8	0	0,0	19	12,8
Subtotal (1)	49	49,5	50	50,5	0	0,0	99	66,4
5-14 años	5	41,7	7	58,3	0	0,0	12	8,1
15-29 años	7	63,6	4	36,4	0	0,0	11	7,4
30-49 años	4	50,0	4	50,0	0	0,0	8	5,4
Subtotal (2)	16	51,6	15	48,4	0	0,0	31	20,8
50-59 años	1	20,0	4	80,0	0	0,0	5	3,4
≥ 60 años	7	70,0	3	30,0	0	0,0	10	6,7
Subtotal (3)	8	53,3	7	46,7	0	0,0	15	10,1
Sin dato	0	0,0	2	50,0	2	50,0	4	2,7
Total	73	49,0	74	49,7	2	1,3	149	100,0

[Volver a la página general](#)

Tabla 2. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por enfermedad y grupo de edad. 2014

Grupos de edad	Diagnóstico								Total	
	Meningitis		Meningitis y sepsis		Sepsis		Otra*			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	42	61,8	11	16,2	7	10,3	8	11,8	68	45,6
12-23 meses	2	16,7	3	25,0	5	41,7	2	16,7	12	8,1
24-59 meses	11	57,9	1	5,3	4	21,1	3	15,8	19	12,8
Subtotal (1)	55	55,6	15	15,2	16	16,2	13	13,1	99	66,4
5-14 años	5	41,7	2	16,7	3	25,0	2	16,7	12	8,1
15-29 años	7	63,6	1	9,1	2	18,2	1	9,1	11	7,4
30-49 años	2	25,0	2	25,0	1	12,5	3	37,5	8	5,4
Subtotal (2)	14	45,2	5	16,1	6	19,4	6	19,4	31	20,8
50-59 años	1	20,0	0	0,0	3	60,0	1	20,0	5	3,4
≥ 60 años	5	50,0	0	0,0	3	30,0	2	20,0	10	6,7
Subtotal (3)	6	40,0	0	0,0	6	40,0	3	20,0	15	10,1
Sin dato	2	50,0	0	0,0	0	0,0	2	50,0	4	2,7
Total	77	51,7	20	13,4	28	18,8	24	16,1	149	100,0

[Volver a la página general](#)

* Especificar cual otra enfermedad por grupo de edad

Grupo de edad en meses y años	Otra enfermedad (número)					Total
	artritis	bacteriemia	neumonía	Pericarditis	S/D	
< 12 meses	1	6	0	0	1	8
12-23 meses	1	0	1	0	0	2
24-59 meses	0	2	1	0	0	3
5-14 años	0	2	0	0	0	2
15-29 años	0	1	0	0	0	1
30-49 años	0	2	0	0	1	3
50-59 años	0	0	0	0	1	1
≥ 60 años	0	0	1	1	0	2
Sin dato	0	0	0	0	2	2
Total	2	13	3	1	5	24

Tabla 3. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y fuente. 2014

Grupos de edad	Fuente						Total	
	Hemocultivo		LCR		Otros líquidos estériles*			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	21	30,9	42	61,8	5	7,4	68	45,6
12-23 meses	7	58,3	3	25,0	2	16,7	12	8,1
24-59 meses	7	36,8	11	57,9	1	5,3	19	12,8
Subtotal (1)	35	35,4	56	56,6	8	8,1	99	66,4
5-14 años	8	66,7	4	33,3	0	0,0	12	8,1
15-29 años	6	54,5	5	45,5	0	0,0	11	7,4
30-49 años	6	75,0	2	25,0	0	0,0	8	5,4
Subtotal (2)	20	64,5	11	35,5	0	0,0	31	20,8
50-59 años	3	60,0	2	40,0	0	0,0	5	3,4
≥ 60 años	6	60,0	2	20,0	2	20,0	10	6,7
Subtotal (3)	9	60,0	4	26,7	2	13,3	15	10,1
Sin dato	1	25,0	2	50,0	1	25,0	4	2,7
Total	65	43,6	73	49,0	11	7,4	149	100,0

[Volver a la página general](#)

***Especificar**

Otros líquidos corporales normalmente estériles (número)				
Grupo de edad en meses y años	líquido sinovial	líq.pericárdico	S/D	Total
< 12 meses	1	0	4	5
12-23 meses	1	0	1	2
24-59 meses	0	0	1	1
5-14 años	0	0	0	0
15-29 años	0	0	0	0
30-49 años	0	0	0	0
50-59 años	0	0	0	0
≥ 60 años	0	1	1	2
Sin dato	0	0	1	1
Total	2	1	8	11

Tablas 4. Distribución de los serogrupos de los aislamientos invasores *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y diagnóstico, 2014

a. Niños < 12 meses						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	22	5	4	1	32	47,1
C	1	1	0	0	2	2,9
W	19	4	2	7	32	47,1
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	1	1	0	2	2,9
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	42	11	7	8	68	100,0

b. Niños de 12-23 meses						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	1	1	1	1	4	33,3
C	0	0	0	0	0	0,0
W	1	2	4	1	8	66,7
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	0	0	0	0	0,0
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	2	3	5	2	12	100,0

c. Niños de 24-59 meses						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	10	0	2	0	12	63,2
C	0	0	0	0	0	0,0
W	1	1	2	2	6	31,6
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	0	0	1	1	5,3
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	11	1	4	3	19	100,0

d. Niños de 5-14 años						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	5	1	2	2	10	83,3
C	0	0	0	0	0	0,0
W	0	1	1	0	2	16,7
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	0	0	0	0	0,0
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	5	2	3	2	12	100,0

e. Personas 15-29 años						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	6	1	0	0	7	63,6
C	0	0	0	0	0	0,0
W	1	0	2	1	4	36,4
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	0	0	0	0	0,0
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	7	1	2	1	11	100,0

f. Personas 30 a 49 años						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	1	0	0	0	1	12,5
C	0	0	0	0	0	0,0
W	1	1	1	3	6	75,0
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	1	0	0	1	12,5
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	2	2	1	3	8	100,0

g. Personas 50 a 59 años						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	0	0	1	0	1	20,0
C	0	0	0	0	0	0,0
W	1	0	2	1	4	80,0
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	0	0	0	0	0,0
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	1	0	3	1	5	100,0

h. Personas ≥ 60 años						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	1	0	0	0	1	10,0
C	0	0	0	0	0	0,0
W	4	0	3	2	9	90,0
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	0	0	0	0	0,0
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	5	0	3	2	10	100,0

i. Sin dato de edad						
Serogrupo	Diagnóstico				Total	
	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
	n					
A	0	0	0	0	0	0,0
B	1	0	0	1	2	50,0
C	0	0	0	0	0	0,0
W	1	0	0	1	2	50,0
X	0	0	0	0	0	0,0
Y	0	0	0	0	0	0,0
Z	0	0	0	0	0	0,0
E	0	0	0	0	0	0,0
NG	0	0	0	0	0	0,0
Total	2	0	0	2	4	100,0

[Volver a la página general](#)

Tabla 5. Sensibilidad antimicrobiana de *Neisseria meningitidis*. 2014

Criterios: CLSI 2014

Grupos de edad	n	Penicilina (CIM)					
		Sensibles		Intermedia		Resistente	
		n	%	n	%	n	%
< 12 meses	60	37	61,7	23	38,3	0	0,0
12-23 meses	10	7	70,0	3	30,0	0	0,0
24-59 meses	17	6	35,3	11	64,7	0	0,0
Subtotal (1)	87	50	57,5	37	42,5	0	0,0
5-14 años	9	6	66,7	3	33,3	0	0,0
15-29 años	7	4	57,1	3	42,9	0	0,0
30-49 años	7	5	71,4	2	28,6	0	0,0
Subtotal (2)	23	15	65,2	8	34,8	0	0,0
50-59 años	5	4	80,0	1	20,0	0	0,0
≥ 60 años	8	5	62,5	3	37,5	0	0,0
Subtotal (3)	13	9	69,2	4	30,8	0	0,0
Sin dato	6	1	16,7	5	83,3	0	0,0
Total	129	75	58,1	54	41,9	0	0,0

n	Rifampicina (CIM)					
	Sensibles		Intermedia		Resistente	
	n	%	n	%	n	%
60	60	100,0	0	0,0	0	0,0
10	10	100,0	0	0,0	0	0,0
17	17	100,0	0	0,0	0	0,0
87	87	100,0	0	0,0	0	0,0
9	9	100,0	0	0,0	0	0,0
7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
23	23	100,0	0	0,0	0	0,0
5	5	100,0	0	0,0	0	0,0
8	8	100,0	0	0,0	0	0,0
13	13	100,0	0	0,0	0	0,0
6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
129	129	100,0	0	0,0	0	0,0

Grupos de edad	n	Cloranfenicol (CIM)					
		Sensibles		Intermedia		Resistente	
		n	%	n	%	n	%
< 12 meses	60	60	100,0	0	0,0	0	0,0
12-23 meses	10	10	100,0	0	0,0	0	0,0
24-59 meses	17	17	100,0	0	0,0	0	0,0
Subtotal (1)	87	87	100,0	0	0,0	0	0,0
5-14 años	9	9	100,0	0	0,0	0	0,0
15-29 años	7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
30-49 años	7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
Subtotal (2)	23	23	100,0	0	0,0	0	0,0
50-59 años	5	5	100,0	0	0,0	0	0,0
≥ 60 años	8	8	100,0	0	0,0	0	0,0
Subtotal (3)	13	13	100,0	0	0,0	0	0,0
Sin dato	6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
Total	129	129	100,0	0	0,0	0	0,0

n	Ciprofloxacina (CIM)					
	Sensibles		Intermedia		Resistente	
	n	%	n	%	n	%
60	60	100,0	0	0,0	0	0,0
10	10	100,0	0	0,0	0	0,0
17	17	100,0	0	0,0	1	5,9
87	87	100,0	0	0,0	1	1,1
9	9	100,0	0	0,0	0	0,0
7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
23	23	100,0	0	0,0	0	0,0
5	5	100,0	0	0,0	0	0,0
8	8	100,0	0	0,0	0	0,0
13	13	100,0	0	0,0	0	0,0
6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
129	128	99,2	0	0,0	1	0,8

Nota :

[Volver a la página general](#)